

# Notas sobre Conjuntos(1)

Anjolina Grisi de Oliveira

Centro de Informática  
Universidade Federal de Pernambuco

CIn-UFPE

## Definições Básicas

### Definição (Conjunto/elemento)

*Os objetos de um conjunto são chamados de elementos ou membros do conjunto. Dizemos que um conjunto  $A$  contém seus elementos.*

- Escrevemos  $a \in A$  para denotar que  $a$  é um elemento de  $A$ ; e  $a \notin A$  para denotar que  $a$  não é um elemento de  $A$ ;

## Definições Básicas

### Definição (Conjunto/elemento)

*Os objetos de um conjunto são chamados de elementos ou membros do conjunto. Dizemos que um conjunto  $A$  contém seus elementos.*

- Escrevemos  $a \in A$  para denotar que  $a$  é um elemento de  $A$ ; e  $a \notin A$  para denotar que  $a$  não é um elemento de  $A$ ;

## Definições Básicas

### Definição (Conjunto/elemento)

*Os objetos de um conjunto são chamados de elementos ou membros do conjunto. Dizemos que um conjunto  $A$  contém seus elementos.*

- Escrevemos  $a \in A$  para denotar que  $a$  é um elemento de  $A$ ; e  $a \notin A$  para denotar que  $a$  não é um elemento de  $A$ ;

# Descrevendo conjuntos

- Existem várias maneiras de descrevermos um conjunto:

- Listando seus elementos:  $V = \{a, e, i, o, u\}$
- Definindo uma propriedade:  $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$
- Definição recursiva:

# Descrevendo conjuntos

- Existem várias maneiras de descrevermos um conjunto:

- Listando seus elementos:  $V = \{a, e, i, o, u\}$
- Definindo uma propriedade:  $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$
- Definição recursiva:

$$0 \in A$$

$$\text{Se } x \in A \text{ então } (x+2) \in A$$

# Descrevendo conjuntos

- Existem várias maneiras de descrevermos um conjunto:

1 Listando seus elementos:  $V = \{a, e, i, o, u\}$

Definindo uma propriedade:  $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$

Definição recursiva:

$0 \in V$

$\forall x \in V, x+2 \in V$

# Descrevendo conjuntos

- Existem várias maneiras de descrevermos um conjunto:

- 1 Listando seus elementos:  $V = \{a, e, i, o, u\}$
- 2 Definindo uma propriedade:  $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$
- 3 Definição recursiva:



# Descrevendo conjuntos

- Existem várias maneiras de descrevermos um conjunto:
  - 1 Listando seus elementos:  $V = \{a, e, i, o, u\}$
  - 2 **Definindo uma propriedade:**  $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$
  - 3 Definição recursiva:

# Descrevendo conjuntos

- Existem várias maneiras de descrevermos um conjunto:
  - 1 Listando seus elementos:  $V = \{a, e, i, o, u\}$
  - 2 Definindo uma propriedade:  $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$
  - 3 Definição recursiva:

# Descrevendo conjuntos

- Existem várias maneiras de descrevermos um conjunto:
  - Listando seus elementos:  $V = \{a, e, i, o, u\}$
  - Definindo uma propriedade:  $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$
  - Definição recursiva:**
    - $2 \in A$
    - Se  $x \in A$  então  $(x + 2) \in A$

# Descrevendo conjuntos

- Existem várias maneiras de descrevermos um conjunto:
  - 1 Listando seus elementos:  $V = \{a, e, i, o, u\}$
  - 2 Definindo uma propriedade:  $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$
  - 3 Definição recursiva:
    - 1  $2 \in A$
    - 2 Se  $x \in A$  então  $(x + 2) \in A$

# Descrevendo conjuntos

- Existem várias maneiras de descrevermos um conjunto:
  - 1 Listando seus elementos:  $V = \{a, e, i, o, u\}$
  - 2 Definindo uma propriedade:  $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$
  - 3 Definição recursiva:
    - 1  $2 \in A$
    - 2 Se  $x \in A$  então  $(x + 2) \in A$

# Descrevendo conjuntos

- Diagrama de Venn (John Venn (1881)):
  - Um conjunto  $U$ , universo, que contém todos os objetos sob consideração: retângulo;
  - Dentro do retângulo: círculos (ou outras figuras geométricas) que representam conjuntos;
  - Pontos são usados para representar elementos particulares do conjuntos.

# Descrevendo conjuntos

- Diagrama de Venn (John Venn (1881)):
  - Um conjunto  $U$ , universo, que contém todos os objetos sob consideração: retângulo;
  - Dentro do retângulo: círculos (ou outras figuras geométricas) que representam conjuntos;
  - Pontos são usados para representar elementos particulares do conjuntos.

# Descrevendo conjuntos

- Diagrama de Venn (John Venn (1881)):
  - Um conjunto  $U$ , universo, que contem todos os objetos sob consideração: **retângulo**;
  - Dentro do retângulo: círculos (ou outras figuras geométricas) que representam conjuntos;
  - Pontos são usados para representar elementos particulares do conjuntos.



# Descrevendo conjuntos

- Diagrama de Venn (John Venn (1881)):
  - Um conjunto  $U$ , universo, que contem todos os objetos sob consideração: **retângulo**;
  - Dentro do retângulo: círculos (ou outras figuras geométricas) que representam conjuntos;
  - Pontos são usados para representar elementos particulares do conjuntos.

# Descrevendo conjuntos

- Diagrama de Venn (John Venn (1881)):
  - Um conjunto  $U$ , universo, que contem todos os objetos sob consideração: **retângulo**;
  - **Dentro do retângulo: círculos (ou outras figuras geométricas) que representam conjuntos;**
  - Pontos são usados para representar elementos particulares do conjuntos.

# Descrevendo conjuntos

- Diagrama de Venn (John Venn (1881)):
  - Um conjunto  $U$ , universo, que contem todos os objetos sob consideração: **retângulo**;
  - Dentro do retângulo: círculos (ou outras figuras geométricas) que representam conjuntos;
  - Pontos são usados para representar elementos particulares do conjuntos.

# Descrevendo conjuntos

- Diagrama de Venn (John Venn (1881)):
  - Um conjunto  $U$ , universo, que contem todos os objetos sob consideração: **retângulo**;
  - Dentro do retângulo: círculos (ou outras figuras geométricas) que representam conjuntos;
  - Pontos são usados para representar elementos particulares do conjuntos.

# Descrevendo conjuntos

- Diagrama de Venn (John Venn (1881)):
  - Um conjunto  $U$ , universo, que contem todos os objetos sob consideração: **retângulo**;
  - Dentro do retângulo: círculos (ou outras figuras geométricas) que representam conjuntos;
  - Pontos são usados para representar elementos particulares do conjuntos.

# Descrevendo conjuntos

- Diagrama de Venn (John Venn (1881)):
  - Um conjunto  $U$ , universo, que contem todos os objetos sob consideração: **retângulo**;
  - Dentro do retângulo: círculos (ou outras figuras geométricas) que representam conjuntos;
  - Pontos são usados para representar elementos particulares do conjuntos.

## Definições Básicas

- Alguns conjuntos conhecidos:  $N$  (naturais) =  $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ ,  $Z$  (inteiros) =  $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ , etc;
- O conjunto vazio é denotado por  $\emptyset$  ou  $\{ \}$ .

### Definição (Conjuntos iguais)

*Dizemos que dois conjuntos são iguais se e somente se eles contêm os mesmos elementos.*

### Exemplo

*Os seguintes conjuntos são iguais:*

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3\}$$

## Definições Básicas

### Definição (Subconjunto)

*Um conjunto  $A$  é subconjunto de  $B$  se e somente se todo elemento de  $A$  é também elemento de  $B$ . A notação  $A \subseteq B$  é usada para denotar que  $A$  é subconjunto de  $B$ .*

- $A \subseteq B : \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ ;
- $\emptyset \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;



# Definições Básicas

## Definição (Subconjunto)

*Um conjunto  $A$  é subconjunto de  $B$  se e somente se todo elemento de  $A$  é também elemento de  $B$ . A notação  $A \subseteq B$  é usada para denotar que  $A$  é subconjunto de  $B$ .*

- $A \subseteq B : \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ ;
- $\emptyset \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;

## Definições Básicas

### Definição (Subconjunto)

*Um conjunto  $A$  é subconjunto de  $B$  se e somente se todo elemento de  $A$  é também elemento de  $B$ . A notação  $A \subseteq B$  é usada para denotar que  $A$  é subconjunto de  $B$ .*

- $A \subseteq B : \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ ;
- $\emptyset \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;

## Definições Básicas

### Definição (Subconjunto)

*Um conjunto  $A$  é subconjunto de  $B$  se e somente se todo elemento de  $A$  é também elemento de  $B$ . A notação  $A \subseteq B$  é usada para denotar que  $A$  é subconjunto de  $B$ .*

- $A \subseteq B : \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ ;
- $\emptyset \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;

## Definições Básicas

### Definição (Subconjunto)

*Um conjunto  $A$  é subconjunto de  $B$  se e somente se todo elemento de  $A$  é também elemento de  $B$ . A notação  $A \subseteq B$  é usada para denotar que  $A$  é subconjunto de  $B$ .*

- $A \subseteq B : \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ ;
- $\emptyset \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;

# Definições Básicas

- $P \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;
- SUBCONJUNTO PRÓPRIO: Se  $A \neq B$  e  $A$  é subconjunto de  $B$ :  $A \subset B$ ;
- Se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$  então  $A = B$ ;
- Conjuntos podem ser membros de conjuntos:  
 $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$  ou seja  $\{x \mid x \text{ é um subconjunto de } \{a, b\}\}$

# Definições Básicas

- $P \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;
- SUBCONJUNTO PRÓPRIO: Se  $A \neq B$  e  $A$  é subconjunto de  $B$ :  $A \subset B$ ;
- Se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$  então  $A = B$ ;
- Conjuntos podem ser membros de conjuntos:  
 $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$  ou seja  $\{x \mid x \text{ é um subconjunto de } \{a, b\}\}$

# Definições Básicas

- $P \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;
- **SUBCONJUNTO PRÓPRIO: Se  $A \neq B$  e  $A$  é subconjunto de  $B$ :  $A \subset B$ ;**
- Se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$  então  $A = B$ ;
- Conjuntos podem ser membros de conjuntos:  
 $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$  ou seja  $\{x \mid x \text{ é um subconjunto de } \{a, b\}\}$

## Definições Básicas

- $P \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;
- **SUBCONJUNTO PRÓPRIO:** Se  $A \neq B$  e  $A$  é subconjunto de  $B$ :  $A \subset B$ ;
- Se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$  então  $A = B$ ;
- Conjuntos podem ser membros de conjuntos:  
 $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$  ou seja  $\{x \mid x \text{ é um subconjunto de } \{a, b\}\}$



## Definições Básicas

- $P \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;
- SUBCONJUNTO PRÓPRIO: Se  $A \neq B$  e  $A$  é subconjunto de  $B$ :  $A \subset B$ ;
- Se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$  então  $A = B$ ;
- Conjuntos podem ser membros de conjuntos:  
 $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$  ou seja  $\{x \mid x \text{ é um subconjunto de } \{a, b\}\}$

## Definições Básicas

- $P \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;
- SUBCONJUNTO PRÓPRIO: Se  $A \neq B$  e  $A$  é subconjunto de  $B$ :  $A \subset B$ ;
- Se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$  então  $A = B$ ;
- Conjuntos podem ser membros de conjuntos:  
 $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$  ou seja  $\{x \mid x \text{ é um subconjunto de } \{a, b\}\}$

## Definições Básicas

- $P \subseteq P$ , qualquer que seja  $P$ ;
- SUBCONJUNTO PRÓPRIO: Se  $A \neq B$  e  $A$  é subconjunto de  $B$ :  $A \subset B$ ;
- Se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$  então  $A = B$ ;
- Conjuntos podem ser membros de conjuntos:  
 $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$  ou seja  $\{x \mid x \text{ é um subconjunto de } \{a, b\}\}$

# Cardinalidade

## Definição (Cardinalidade)

*Seja  $S$  um conjunto. Se existem exatamente  $n$  elementos distintos em  $S$ , onde  $n$  é um inteiro não negativo, dizemos que  $S$  é um conjunto **finito** e  $n$  é a **cardinalidade** de  $S$ . A cardinalidade de  $S$  é denotada por  $|S|$ .*

## Definição (Conjunto infinito)

*Um conjunto é dito infinito se ele não é finito.*

# Conjunto das Partes

## Definição (Conjunto das partes)

*Dado um conjunto  $S$ , o conjunto das partes de  $S$  é o conjunto de todos os subconjuntos de  $S$ . O conjunto das partes de  $S$  é denotado por  $P(S)$ .*

- Se um conjunto  $S$  possui  $n$  elementos então o seu conjunto das partes possui  $2^n$  elementos.

# Produto cartesiano

- Conjuntos não são ordenados;
- Precisamos de uma estrutura diferente para representar estruturas ordenada s:  $n$  – *tuplas* ordenadas.

# Produto cartesiano

- Conjuntos não são ordenados;
- Precisamos de uma estrutura diferente para representar estruturas ordenada s:  $n$  – *tuplas* ordenadas.

# Produto cartesiano

- Conjuntos não são ordenados;
- Precisamos de uma estrutura diferente para representar estruturas ordenada s:  $n$  – *tuplas* ordenadas.



# Produto cartesiano

- **2 – tuplas são chamadas de pares ordenados;**
- *n – tuplas ordenadas iguais:*
  - $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  quando  $a_i = b_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .
- $(a, b) \neq (b, a)$ , a menos que  $a$  seja igual a  $b$ .

# Produto cartesiano

- 2 – *tuplas* são chamadas de pares ordenados;
- $n$  – *tuplas* ordenadas iguais:  
 $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  quando  $a_i = b_i$ ,  
 $1 \leq i \leq n$ .
- $(a, b) \neq (b, a)$ , a menos que  $a$  seja igual a  $b$ .

# Produto cartesiano

- 2 – *tuplas* são chamadas de pares ordenados;
- $n$  – *tuplas ordenadas iguais*:
  - $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  quando  $a_i = b_i$ ,  
 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
- $(a, b) \neq (b, a)$ , a menos que  $a$  seja igual a  $b$ .

# Produto cartesiano

- 2 – *tuplas* são chamadas de pares ordenados;
- $n$  – *tuplas* ordenadas iguais:
  - $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  quando  $a_i = b_i$ ,  
 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
- $(a, b) \neq (b, a)$ , a menos que  $a$  seja igual a  $b$ .

# Produto cartesiano

- 2 – *tuplas* são chamadas de pares ordenados;
- $n$  – *tuplas* ordenadas iguais:
  - $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  quando  $a_i = b_i$ ,  
 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
- $(a, b) \neq (b, a)$ , a menos que  $a$  seja igual a  $b$ .

# Produto cartesiano

- 2 – *tuplas* são chamadas de pares ordenados;
- $n$  – *tuplas* ordenadas iguais:
  - $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  quando  $a_i = b_i$ ,  
 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
- $(a, b) \neq (b, a)$ , a menos que  $a$  seja igual a  $b$ .

# Produto cartesiano

- 2 – *tuplas* são chamadas de pares ordenados;
- $n$  – *tuplas* ordenadas iguais:
  - $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  quando  $a_i = b_i$ ,  
 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
- $(a, b) \neq (b, a)$ , a menos que  $a$  seja igual a  $b$ .

# Produto cartesiano

- 2 – *tuplas* são chamadas de pares ordenados;
- $n$  – *tuplas* ordenadas iguais:
  - $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  quando  $a_i = b_i$ ,  
 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
- $(a, b) \neq (b, a)$ , a menos que  $a$  seja igual a  $b$ .



# Produto cartesiano

- 2 – *tuplas* são chamadas de pares ordenados;
- $n$  – *tuplas* ordenadas iguais:
  - $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  quando  $a_i = b_i$ ,  
 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
- $(a, b) \neq (b, a)$ , a menos que  $a$  seja igual a  $b$ .

# Produto cartesiano

## Definição (Produto cartesiano)

*Sejam  $A$  e  $B$  conjuntos arbitrários. o produto cartesiano de  $A$  e  $B$ , denotado por  $A \times B$ , é o conjunto de todos os pares ordenado  $a, b$ , onde  $a \in A$  e  $b \in B$ .*

- $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$ ;
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- $A \times B = B \times A$ ?

# Produto cartesiano

## Definição (Produto cartesiano)

*Sejam  $A$  e  $B$  conjuntos arbitrários. o produto cartesiano de  $A$  e  $B$ , denotado por  $A \times B$ , é o conjunto de todos os pares ordenado  $a, b$ , onde  $a \in A$  e  $b \in B$ .*

- $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$ ;
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- $A \times B = B \times A$ ?

# Produto cartesiano

## Definição (Produto cartesiano)

*Sejam  $A$  e  $B$  conjuntos arbitrários. o produto cartesiano de  $A$  e  $B$ , denotado por  $A \times B$ , é o conjunto de todos os pares ordenado  $a, b$ , onde  $a \in A$  e  $b \in B$ .*

- $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$ ;
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- $A \times B = B \times A$  ?

# Produto cartesiano

## Definição (Produto cartesiano)

*Sejam  $A$  e  $B$  conjuntos arbitrários. o produto cartesiano de  $A$  e  $B$ , denotado por  $A \times B$ , é o conjunto de todos os pares ordenado  $a, b$ , onde  $a \in A$  e  $b \in B$ .*

- $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$ ;
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- $A \times B = B \times A$ ?

# Produto cartesiano

## Definição (Produto cartesiano)

*Sejam  $A$  e  $B$  conjuntos arbitrários. o produto cartesiano de  $A$  e  $B$ , denotado por  $A \times B$ , é o conjunto de todos os pares ordenado  $a, b$ , onde  $a \in A$  e  $b \in B$ .*

- $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$ ;
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- $A \times B = B \times A$ ?

# Exercícios

- Quais das sentenças a seguir são verdadeiras para conjuntos arbitrários  $A$ ,  $B$  e  $C$ ? Justifique as respostas falsas (pode usar contra-contrá-exemplo quando for conveniente).
  - 1  $\{\emptyset\} = \{0\}$
  - 2  $\emptyset \in \{\emptyset\}$
  - 3  $\{b, c\} \in \{b, c\}$
  - 4  $AXB = BXA$
  - 5 Se  $A \neq B$  e  $B \neq C$  então  $A \neq C$

# Exercícios

- Quais das sentenças a seguir são verdadeiras para conjuntos arbitrários  $A$ ,  $B$  e  $C$  ? Justifique as respostas falsas (pode usar contra-contras-exemplo quando for conveniente).
  - 1  $\{\emptyset\} = \{0\}$
  - 2  $\emptyset \in \{\emptyset\}$
  - 3  $\{b, c\} \in \{b, c\}$
  - 4  $AXB = BXA$
  - 5 Se  $A \neq B$  e  $B \neq C$  então  $A \neq C$



# Exercícios

- Quais das sentenças a seguir são verdadeiras para conjuntos arbitrários  $A$ ,  $B$  e  $C$ ? Justifique as respostas falsas (pode usar contra-contra-exemplo quando for conveniente).
  - 1  $\{\emptyset\} = \{0\}$
  - 2  $\emptyset \in \{\emptyset\}$
  - 3  $\{b, c\} \in \{b, c\}$
  - 4  $AXB = BXA$
  - 5 Se  $A \neq B$  e  $B \neq C$  então  $A \neq C$

# Exercícios

- Quais das sentenças a seguir são verdadeiras para conjuntos arbitrários  $A$ ,  $B$  e  $C$  ? Justifique as respostas falsas (pode usar contra-contrá-exemplo quando for conveniente).
  - 1  $\{\emptyset\} = \{0\}$
  - 2  $\emptyset \in \{\emptyset\}$
  - 3  $\{b, c\} \in \{b, c\}$
  - 4  $AXB = BXA$
  - 5 Se  $A \neq B$  e  $B \neq C$  então  $A \neq C$

# Exercícios

- Quais das sentenças a seguir são verdadeiras para conjuntos arbitrários  $A$ ,  $B$  e  $C$  ? Justifique as respostas falsas (pode usar contra-contrário-exemplo quando for conveniente).
  - 1  $\{\emptyset\} = \{0\}$
  - 2  $\emptyset \in \{\emptyset\}$
  - 3  $\{b, c\} \in \{b, c\}$
  - 4  $AXB = BXA$
  - 5 Se  $A \neq B$  e  $B \neq C$  então  $A \neq C$

# Exercícios

- O que pode ser dito sobre  $A$  se  $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$  ?
- Nesse exercício o **paradoxo de Russel** é apresentado. Seja  $S$  um conjunto que contem um conjunto  $x$  se o conjunto  $x$  não pertence a ele próprio, ou seja  $S = \{x \mid x \notin x\}$ .
  - 1 Mostre que a suposição de que  $S$  é membro de  $S$  leva a uma contradição;
  - 2 mostre que a suposição de que  $S$  não é membro de  $S$  leva a uma contradição.

# Exercícios

- O que pode ser dito sobre  $A$  se  $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$  ?
- Nesse exercício o **paradoxo de Russel** é apresentado. Seja  $S$  um conjunto que contem um conjunto  $x$  se o conjunto  $x$  não pertence a ele próprio, ou seja  $S = \{x \mid x \notin x\}$ .
  - 1 Mostre que a suposição de que  $S$  é membro de  $S$  leva a uma contradição;
  - 2 mostre que a suposição de que  $S$  não é membro de  $S$  leva a uma contradição.

# Exercícios

- O que pode ser dito sobre  $A$  se  $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$  ?
- Nesse exercício o **paradoxo de Russel** é apresentado. Seja  $S$  um conjunto que contem um conjunto  $x$  se o conjunto  $x$  não pertence a ele próprio, ou seja  $S = \{x \mid x \notin x\}$ .
  - 1 Mostre que a suposição de que  $S$  é membro de  $S$  leva a uma contradição;
  - 2 mostre que a suposição de que  $S$  não é membro de  $S$  leva a uma contradição.

# Exercícios

- O que pode ser dito sobre  $A$  se  $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$  ?
- Nesse exercício o **paradoxo de Russel** é apresentado. Seja  $S$  um conjunto que contem um conjunto  $x$  se o conjunto  $x$  não pertence a ele próprio, ou seja  $S = \{x \mid x \notin x\}$ .
  - 1 Mostre que a suposição de que  $S$  é membro de  $S$  leva a uma contradição;
  - 2 mostre que a suposição de que  $S$  não é membro de  $S$  leva a uma contradição.